



דפי הסבר תרופות, חיסונים ותכשירים וטרינריים

אסטרטגית החברה הינה מציאת תרופות ותכשירים וטרינריים בכל העולם ורישומם בישראל באיכות הגבוהה ביותר ובמחירים הזולים ככל האפשר על מנת לתת למגדל את המוצר הטוב ביותר ובמחיר הנמוך ביותר.

חברת פיור סוכנויות וספארי עדי וטרינריה רואה את הלקוח בעדיפות עליונה על ידי התמקדות בלקוח ואספקה של מוצרים איכותיים ומתן שירות מהיר ברמה גבוהה.

שותפים עסקיים, המיצגים את מיטב החברות פארמה, לרשות המגדל ישראלי



Florfenicen 300 mg/ml



Florfenicol injectable

PHARMACEUTICAL FORM

Injectable solution

TARGET SPECIES

Sheep / Swine / Cattle

PACK SIZES

Vials containing 100 and 250 ml.
C.P. 10 x 100 ml. and 10 x 250 ml



INJECTABLE

פלורפניסן 300

אנטיביוטיקה רחבת טווח לטיפול במחלות נשימה בפרות וכבשים

הרכב

כל 1 מ"ל מכיל Florfenicol 300 mg

התוויות

לטיפול במחלות נשימה הנגרמים עקב זיהומים הנגרמים על ידי *Pasteurella multocida*, *Haemophilus sommus*, *Mannheimia hemolytica* רגישים
לפלורפניקול בבקר וכבשים (BRD).

מינון

20 מ"ג לקילו משקל חי בהזרקה לשריר בהתאם להוראות בתווית המוצר.
1 מ"ל לכל 15 ק"ג משקל גוף.

אריזה

משווק בבקבוקים של 100 – 250 מ"ל.

paraofor CRYPTO



140 mg/ml oral solution for non-ruminant calves

Unique approach to Cryptosporidiosis



מפחית משמעותית את הופעת השלשול וזמן התחלואה עקב

Cryptosporidium parvum

טיפול בזיהומים במערכת העיכול הנגרמת על ידי *Escherichia coli*

מתן מינון מומלץ:

בבליעה:

מינון: 2.5 מ"ל של מוצר / 10 ק"ג BW ליום במשך 3 - 7 ימים רצופים.

ישירות בפה , במי שתייה, חלב או תחליף חלב.

Censulfatrim

Antibiotic



תרופות מקבילות:

נורודין, דיאזיפרים,

אינטרפרים

לשימוש:

זיהומים מערכתיים הנגרמים על ידי
מיקרואורגניזמים הרגישים לאסוציאציה של
sulfadiazine-trimethoprim.

השילוב של סולפדיאזין וטרימתופריים קוטל
חיידקים ובעל קשת רחבה של פעולה כנגד
חיידקים גרם-חיוביים וגרם-שליליים, כולל:
גרם-חיובי: Corynebacterium spp.,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
גרם שלילי: אקטינובצילוס spp., בורדטלה
spp., Escherichia coli, המופילוס spp.,
Klebsiella spp., Pasteurella spp. סלמונלה

מינון:

1 סמ"ק ל 16 ק"ג

זמן המתנה:

בשר: 12 יום.

חלב: 48 שעות

Censulfatrim
Injectable solution
Sulphadiazine - Trimethoprim

Category D (EMA)
First choice group –
European categorization plan of
antibiotics for veterinary use.

Respiratory infections
Genitourinary infections
Milk 48 h
Gastrointestinal infections

Withdrawal period:
Cattle: Meat: 12 days, Milk: 48 hours.
Pigs: Meat: 20 days.
Horses: Meat: 28 days.

cenavisa



Marbosyva® 100 mg/ml

Marbofloxacin 100 mg



טיפול בזיהומים בדרכי הנשימה
הנגרמים על ידי זנים רגישים
למרבופלוקסצין של *Histophilus somni*,
Mannheimia hemolytica, *Pasteurella*
Mycoplasma bovis ו- *multocida*
טיפול בדלקת עטין חריפה הנגרמת על
ידי זנים של *Escherichia coli* הרגישים
למרבופלוקסצין, בתקופת התחלובה

תרופות מקבילות:

מובוציל, אנרפלוקסין, ותמר,
מרבונור

זיהומים בדרכי הנשימה: המינון המומלץ הוא 8 מ"ג לק"ג משקל גוף (2 מ"ל / 25 ק"ג משקל גוף) בזריקה אחת תוך שרירית.

דלקת עטין חריפה: המינון המומלץ הוא 2 מ"ג / ק"ג משקל גוף (1 מ"ל / 50 ק"ג רוחק) בזריקה יומית אחת תוך שרירית אותה עורית, במשך 3 ימים רצופים.

Gonasyll



מרכיב פעיל


Gonadorelin acetate 50µg

הורמון השחרור של גונדורופין המיוצר בהיפוטלמוס, הגורם לייצור ושחרור הורמונים גונדורופיים מההיפופיזה הקדמית. גונדורלין גורם לייצור ושחרור של ההורמונים LH ו-FSH מההיפופיזה ומסייע בכך לשיפור ביצועי הפוריות בבקר.

התוויה:

סנכרון הורמונלים יחומים

OVSYNCH : פרוטוקול המשלב שימוש ב- GnRH (גונסיל) ו- PG



מינון והוראות שימוש: טיפול בציסטות פולקלוריים בשחלות: 2 מ"ל למנה.

טיפול פוריות: 2 מ"ל למנה. הטיפול צריך להיעשות בזמן ההזרעה

מאפיינים פרמקולוגיים ונתונים פרמקוקינטיים:

GnRH (גורם משחרר גונדורופין) שולט ומתאם את הרצף שרשרת הורמונלית, שהיא הבסיס למחזור האסטרוגני. ממריץ שחרור LH ו-FSH לאחר מתן תוך שרירי, גונדורלין הוא נספג במהירות, עם מחצית חיים של פלזמה של 20 דקות. שלושים דקות לאחר מתן כבר מתגלה עלייה ברמת ה-LH


Digestosyva – דיג'סטוסיווה




Menbutone	100.0 mg/ml
Chlorocresol	2.0 mg/ml
Sodium metabisulphite (E 223)	2.0 mg/ml
Edetic acid	2.0 mg/ml

להחזרת תפקוד תקין של מערכת העיכול

איך עובד ה Digestosyva?



מנגנון פעולה:



שיפור כללי בעיכול וספיגת המזון

- פועל לשיפור תפקוד הכבד
- מקדם הפרשת מרה
- פועל על הבלב
- מגרה את הפרשת מיץ הבלב, מגביר את ריכוז הטרופסין שלו.
- פועל על הקיבה
- ממריץ את הפרשת מיץ הקיבה, בעיקר טריפסין

מתי נשתמש ב- Digestosyva בבקר?

לשימוש: להחזרת תפקוד תקין של מערכת העיכול

מאפיינים פרמקולוגיים כלליים: Menbutone הוא הנגזר מחומצה פרופריונית, עם פעולה על מערכת העיכול, על הכבד, הבלב והבטן.

מאפיינים פרמקודינמיים: Menbutone בכבד השפעה בהפרשת המרה, הן בנפח והן בחומרים הכלולים (פיגמנט, חומר יבש ומלחים). מגביר את הפרשת מיץ בלבב, ובמיוחד מגדיל את אחוז הטרופסין בקיבה ובעיקר של פפסין, העולה מעט לאחר מתן Menbuton.

טרופסין מופרש למעיים, שם הוא מפרק חלבונים לפפטידים קטנים יותר או לחומצות אמינו. האנזים חשוב לקליטת חלבון במזון. שימושים

בקר: עיכול, הרעלת מזון, קטוזיס, אנורקסיה. כבשים ועיזים: עיכול, רעלת היריון.

Zooresp

תיאור המוצר:

מבוסס על תמציות צמחים טהורות, המספקות שימוש בטוח ובלתי רעיל, נטול שאריות כימיות



ועמידות בפני חיידקים.

zooresp מיועדת:

לשלוט ולטפל במספר מחלות נשימה כרוניות וחריפות הנגרמות על ידי נגיפים ומיקופלזמה, לחסל תסמינים של דרכי הנשימה כמו אסטמה, שיעול, צרידות, סטרידור, דלקת בדרכי הנשימה יש לו גם פעולה חזקה נגד סטריס.

הרכב: תמצית: Glycyrrhiza glabra and Cynara scolimus

Glycyrrhiza glabra שם עברי: שוש קירח | ליקוריץ

הוא אחד מצמחי המרפא העתיקים והנפוצים ביותר, הן ברפואות מסורתיות של תרבויות עתיקות רבות והן ברפואות הצמחים המודרנית. הסינים מייחסים לו השפעה על 12 ערוצי האנרגיה בגוף (המרידיאנים), וגם ההודים מייחסים לו סגולות רבות. הוא שימש ברפואה היוונית העתיקה כמו גם ברפואה הערבית העתיקה. ברפואת הצמחים המודרנית מיוחסת לצמח עוצמת פעילות מתונה, והוא מותווה בעיקר לטיפול במערכות הנשימה והעיכול. טעמו של הצמח וטווח הפעילות הרחב שלו הופכים אותו לאחד הצמחים הנפוצים ביותר בפורמולות מודרניות.

שימושים מקובלים עיקריים:

אלרגיות, נוגד שיעול, אסטמה, ברונכיטיס (כרוני), כיב פפטי (אולקוס), מחלות מעיים דלקתיות (IBD)

ארטישוק: Cynara scolimus

תכונות רפואיות עיקריות:

משפר פעילות כבד ותהליכי עיכול וספיגה. מגביר ייצור והפרשת מרה, מפחית רמות שומנים בדם,

משקם רקמות כבד פגועות, מטהר דם (Depurative)

נוגד חמצון 'מפחית רמות סוכר בדם (Hypoglycemic)



קלסיקל 300

Calcikel 300

לטיפול בחוסר איזון במינרלים בפרות ובכבשות

הרכב

Calcium gluconate 279, 24 mg

Magnesium chloride 40 mg

Boric acid 77, 05 mg

Methyl parahydroxybenzoate (E218) 1 mg

Water for injections up to 1 ml

התוויות

טיפול בבעיות של חוסר איזון במינרלים וקדחת החלב בפרות ובכבשים.

Acute hypocalcaemia – מתאים במיוחד לטיפול ב-

. Acute hypomagnesaemia in cattle (**grass tetany**), puerperal paresis, **milk fever**

מינון

יש להזריק את התכשיר לתוך הווריד בלבד לאט. הזרקה תת-עורית אסורה בהחלט.

לפני ההזרקה רצוי לחמם את התכשיר לטמפרטורת גוף.

פרות בוגרות במשקל בין 500 ל – 600 ק"ג: בקבוק אחד של 500 מ"ל.

כבשים: 1 מ"ל לקילוגרם .

אזהרות

אין לטפל בבעלי חיים הסובלים מבעיות לב או במערכת הקרדיווסקולרית .

במקרים של hyperparathyroidia, renal insufficiency, acidosis, intoxication with heart glycosides יש להתייעץ עם וטרינר לפני השימוש.

דורש מרשם וטרינר .

זמן המתנה

0 ימים

TilmoVet 300 Injection

מכיל 300 מ"ג / מ"ל טילמיקוזין לבקר ולצאן



תכונות

מנה בודדת שומרת על ריכוזים טיפוליים ברקמות היעד למשך 3 ימים

ספיגה מהירה לאחר מתן תת עורי

אנטיביוטיקה מרוכזת בריאות, במיוחד alveolar macrophages

להזרקת טילמיקוזין שיעורי ריפוי גבוהים מאוד של ריקבון הטלף בכבשים

התוויה:

לטיפול ריקבון הטלף בכבשים.

לשימוש בבקר לטיפול במחלות נשימה בקר (BRD) הקשורות למנהמיה (פסטרלה) המוליטיקה ופסטרולה מולטיצידה,

ואורגניזמים אחרים הרגישים לטילמיקוזין.

מתן מינון: מזריקים רק תת עורית בחלק הקדמי של הצוואר.

בקר:

ל- BRD יש לתת מנה תת עורית אחת של 10 מ"ג / ק"ג משקל גוף (1 מ"ל לכל 30 ק"ג). אין להזריק יותר מ- 15 מ"ל לאתר הזרקה. אם לא נצפה שום שיפור תוך 48 שעות, יש לבחון מחדש את האבחנה.

כבש: לכף הרגל יש לתת מנה תת עורית אחת של 5 מ"ג / ק"ג משקל גוף (1 מ"ל לכל 60 ק"ג). אין לטפל בכבשים במשקל של פחות מ- 15 ק"ג.



תוספי מזון לבעלי חיים

משווק על ידי פיור
סוכנויות בע"מ

Glycoboost



מספר אנרגיה גלוקוגני. מוצר בעל ערך תזונתי גבוה וטעים מאוד המיועד לפרות, כבשים ועזים בתקופה שלפני המלטה ובתקופת מעבר ב 100 ימי חליבה הראשונים Glycoboost. מספר את מאזן האנרגיה השלילי ומונע כבד שומני וקטוזיס. מכיל בטאין ומסייע במניעת את ההשפעות השליליות של עקת חום.	תיאור המוצר
גליצרול 75%, מולסה מסלק סוכר 15%, בטאין צמחי 5%, מים, מינרלים ואפר	הרכב
דרך מערכת המים, כתוספת מעל המזון	יישום
Glycoboost - היא אלטרנטיבה טובה ל monopropyleneglycol (MPG) באמצעות שילוב של גליצרול בטאין ומולסה. • משפר את טעימות המנה. • מגן על הכרס ועל המעי • משפר תפקודי כבד ועוזר למניעת קטוזיס • בטאין מגן על תאים, חלבונים, ואנזימים מלחץ סביבתי • משפר ספיגת חלבונים, אלקטרוליטים ונוזלים ומגן מעקת חום.	ערכים נוספים
<u>לפרות חולבות</u>: מומלץ להגיש החל מ 14 ימים לפני ההמלטה עד 14 יום אחרי ההמלטה, בין 250 עד 500 גרם לפרה ליום. לצאן: למניעת רעלת הריון מומלץ להגיש במנת הצאן במיטן של 70 גרם לכבשה ליום למשך 14-28 יום לפני ההמלטה. לטיפול: לצאן ברמת סיכון גבוהה (גרם) ניתן להמשיך בטיפול להמשך 90 יום לאחר ההמלטה לשיפור תגובת החלב	מינון מומלץ

גליקולמיקס אנרג'י GLICOLMIX ENERGY

FEED MINERAL FREELY AVAILABLE SPECIAL PRE-POST-BIRTH MINERAL FEED WITH 10 % PROPYLENEGLYCOL		אבן ליקה מעושר עם פרופילין גליקול (10%) מזון משלים, מתאים לתקופות לפני ואחרי המלטה. מיועד לבקר, צאן ועיזים.	
ANALYTICAL COMPONENTS		רכיבים אנליטיים:	
Sodium -Na- 6.00 % - Calcium -Ca- 12.00 % Phosphore -P- 1.00 % - Magnesium -Mg- 3.00 %		Sodium -Na- 6.00 % - Calcium -Ca- 12.00 % Phosphore -P- 1.00 % - Magnesium -Mg- 3.00 %	
Additives mg/kg		תוספים mg/kg	
3b603 Zinc (oxide of zinc) -Zn-	1,500 mg/kg	3b603 Zinc (oxide of zinc) -Zn-	1,500 mg/kg
3b503 Manganese (sulphate manganese monohydrate)-Mn-	2,000 mg/kg	3b503 Manganese (sulphate manganese monohydrate)-Mn-	2,000 mg/kg
3b101 Iron (carbonate of iron II) -Fe-	500 mg/kg	3b101 Iron (carbonate of iron II) -Fe-	500 mg/kg
3b202 Iodine (anhydrous calcium iodine) -I-	250 mg/kg	3b202 Iodine (anhydrous calcium iodine) -I-	250 mg/kg
3b301 Cobalt (acetate of cobalt II tetrahydrate) -Co-	70 mg/kg	3b301 Cobalt (acetate of cobalt II tetrahydrate) -Co-	70 mg/kg
3b801 Selenium (sodium selenite) -Se-	20 mg/kg	3b801 Selenium (sodium selenite) -Se-	20 mg/kg
3b811 Selenium (seleniomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) -Se-	1 mg/kg	3b811 Selenium (seleniomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) -Se-	1 mg/kg
Vitamins:		ויטמינים:	
Vitamin A (3a672a)	250,000 UI/kg	Vitamin A (3a672a)	250,000 UI/kg
Vitamin D3 (3a671)	50,000 UI/kg	Vitamin D3 (3a671)	50,000 UI/kg
Vitamin E (3a700)	1,000 mg/kg	Vitamin E (3a700)	1,000 mg/kg
Vitamin B12	3 mg/kg	Vitamin B12	3 mg/kg
COMPOSITION:		הרכב:	
Sodium Chloride, Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Dicalcium Phosphate, Molasses, 1.2 propanediol		Sodium Chloride, Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Dicalcium Phosphate, Molasses, 1.2 propanediol	
BATCH N°: 20/3510 - MANUFACTURE DATE: 23-10-2020		תאריך ייצור: 23-10-2020 מספר אצווה: 20/3510	
EXPIRY DATE: USE BEFORE: 10/2021		הגופות רצות להשתמש לפני: 10/2021	
INSTRUCTIONS FOR USE: Use free access		הוראות לשימוש: יש למזן את אבני הליקיה על ידי מקורות מים.	
Try to keep the animals have water in everything moment.		אחסון: שמור במקום סגור יבש וקריר הרחק מהיגיד יום של ילדים.	
Store in a cool and dry place protected from moisture		מינון: בצורה חופשית. 30 יום לפני המלטה בעלי חיים 21 יום אחרי המלטה.	
DOSING: Freely available.		בקר - דלי אחד לכל 25-10 בעלי חיים	
Distribute in batches during the previous 30 days and 21 days after the birth of the animals.		כבשים ועזים - דלי אחד לכל 30-25 בעלי חיים	
Doseage: - Cattle 1 bucket every 10-25 animals		בקר - דלי אחד לכל 25-10 בעלי חיים	
- Sheep and Goat livestock - 1 bucket every 25-30 animals		כבשים ועזים - דלי אחד לכל 30-25 בעלי חיים	

 Distributor:
MP VET LTD
P.O.B 5465 - Herzliya, 4615302 - Israel
Phone: +972-72-244959
Email: pbachrach@gmail.com

20 ק"ג
משקל:

nutriblock
NUTRICIÓN ANIMAL
תועדת היתר מהמחלקה לביקורת טיב מספוד המשרד החקלאות מספר 664
היבואן: אס.פי.וס בע"מ - מושב צור משה
NUTRIBLOCK S.L. Spain
ריצור רפס: ESP08300761

מולסה מעושרת בפרופילין גליקול (10%)
מזון משלים, מתאים לתקופות לפני ואחרי המלטה. מיועד לבקר, צאן ועיזים.

רכיבים אנליטיים:
Sodium -Na- 6.00 % - Calcium -Ca- 12.00 %
Phosphore -P- 1.00 % - Magnesium -Mg- 3.00 %

תוספים mg/kg
3b603 Zinc (oxide of zinc) -Zn- 1,500 mg/kg
3b503 Manganese (sulphate manganese monohydrate)-Mn- 2,000 mg/kg
3b101 Iron (carbonate of iron II) -Fe- 500 mg/kg
3b202 Iodine (anhydrous calcium iodine) -I- 250 mg/kg
3b301 Cobalt (acetate of cobalt II tetrahydrate) -Co- 70 mg/kg
3b801 Selenium (sodium selenite) -Se- 20 mg/kg
3b811 Selenium (seleniomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) -Se- 1 mg/kg

ויטמינים:
Vitamin A (3a672a) 250,000 UI/kg
Vitamin D3 (3a671) 50,000 UI/kg
Vitamin E (3a700) 1,000 mg/kg
Vitamin B12 3 mg/kg

הרכב:
Sodium Chloride, Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Dicalcium Phosphate, Molasses, 1.2 propanediol

תאריך ייצור: 23-10-2020 **מספר אצווה:** 20/3510
להשתמש לפני: 10/2021

אחסון: שמור במקום סגור יבש וקריר הרחק מהיגיד יום של ילדים
הוראות לשימוש: יש לפזר את אבני הליקיה על ידי מקורות מים
מינון: בצורה חופשית. 30 יום לפני המלטה בעלי חיים 21 יום אחרי המלטה בעלי חיים.

בקר - דלי אחד לכל 25-10 בעלי חיים
כבשים ועזים - דלי אחד לכל 30-25 בעלי חיים



Distributor:
MP VET LTD
P.O.B 5465 - Herzliya, 4615302 - Israel
Phone: 050-7224282

GLICOLMIX ENERGY

גליקולמיקס אנרג'י



משקל: 20 ק"ג

תועדת היתר מהמחלקה לביקורת טיב מספוד המשרד החקלאות מספר 664
היבואן: אס.פי.וס בע"מ - מושב צור משה

NUTRIBLOCK S.L. Spain
Factory number: ESP08300761

nutriblock
NUTRICIÓN ANIMAL



ROTAGAL

חיסון אקטיבי לפרות ועגלות בהריון

כדי לספק לעגלים חסינות פסיבית להפחתת התמותה, שכיחות וחומרת השלשול הנגרמת על ידי נגיף רוטה וירוס בקר, נגיף והפחתת נגיף רוטה וירוס קורונה על ידי בעגלים נגועים. (E. coli F5 K99) קורונה ואנטרופאטוגני

התחלת חסינות: חסינות פסיבית מתחילה בהאכלה של קולוסטרום.

מינון ודרך מתן: לשימוש תוך שרירי.

מנה אחת: 3 מ"ל

גודל האריזה 15 מ"ל (5 מנות), 90 מ"ל (30 מנות)



הגנה על עגלים תלויה בנוכחות נוגדנים בקולוסטרליים (המתקבלים מפרות מחוסנות) במעיים במהלך השבועות הראשונים לחייהם עד להיווצרות מצב חיסוני אינדיבידואלי של העגלים. יש לספק לכל העגלים נפח מספק של קולוסטרום תוך שש שעות לאחר ההמלטה. ריכוז השיא של הנוגדנים בקולוסטרום מתרחש בין 0 ל-24 שעות לאחר המלטה.

Veyx JECUPLEX 500 ML



חומצות אמינו L- קרניטין מינרלים ויטמינים

- ויסות חילוף החומרים
- שיפור מטבוליזם השומן
- הגנה על איברים פנימיים במיוחד הכבד
- מסייע בתקופת החלמה , מאמץ יתר, תגובות לחץ העקה סטרס
- משלים חסרים ,
- ויטמינים
- מניעה ותמיכה בטיפול בקטוזיס

שימוש ומינון מומלץ

פרות חלב: עד 500 מ"ל (3-6 שבועות לאחר ההמלטה),

ניתן לחזור על הטיפול לאחר 24 שעות;

כבשים: עד 100 מ"ל (6 שבועות אחרונים לפני ושלושת השבועות הראשונים לאחר המלטת הכבשים),

ניתן לחזור על הטיפול לאחר 24 שעות

1 liter contains

10% glucose
1.5% calcium gluconate
4,000 mg magnesium sulfate
7,000 mg L-carnitine
3,750 mg betaine hydrochloride
3,000 mg nicotinamide (vitamin B3)
500 mg L-lysine
500 mg DL-methionine
500 mg glycine
360 mg dexpantenol (vitamin B5)
100 mg DL-valine

80 mg L-leucine
60 mg DL-phenylalanine
50 mg L-arginine
40 mg L-isoleucine
40 mg L-threonine
20 mg L-histidine
20 mg L-tryptophan
1000 µg vitamin B12
200 mg vitamin B1 200 mg of vitamin B6
80 mg of vitamin B2 blend ("butaforom 5 GL")

ספמקס Cefamax

תכשיר לפרות בתקופת היובש לטיפול ומניעה של **דלקת עטין** לשימוש וטרינרי



הרכב:

כל מזרק בנפח 10 מ"ל מכיל:

(mg 300).....Benzathine (Cephapirin)

תיאור ופעולה

החומר הפעיל ב- CEFAMAX הוא cefapirin, אנטיביוטיקה של β -lactam מקבוצת הצפלוספורינים מהדור הראשון.

Cefapirin מעכב את הסינתזה של דופן החיידק, וכתוצאה מכך פעולה בקטריוצידיית.

זהו אנטיביוטיקה עם ספקטרום פעיל רחב כנגד חיידקים חיוביים וגרם שליליים (כגון סטרפטוקוקוס spp. ו

Staphylococcus spp., Proteus spp., Klebsiella spp., E.coli, enterobacterias).

התוויות לשימוש:

מיועד לפרות בתקופת היובש:

לטיפול בדלקת עטין תת-קלינית ולמניעת זיהומים חדשים שנגרמים על ידי aureus Staphylococcus,agalactiae

Staphylococcus,Streptococcus-dysgalactiae Streptococcus-uberis

מתן ואופן מינון

יש לתת תכולת מזרק אחד בכל רבע עטין על ידי הזרקה לתוך העטין בתחילת תקופת היובש. יש לחלוב היטב כל עטין ולהוציא ממנו את כל החלב טרם מתן המשחה בזריקה לתוך הדד. מעבר לכך, יש לנקות ולחטא את הפטמה. לאחר מכן יש להסיר את הקפסולה מהמזרק, להחדיר את המזרק לתוך הפטמה ולהזריק את המוצר באיטיות. ניתן לעסות קלות את העטין כדי לסייע למוצר להתפשט ברבע. יש לעסות קלות גם את הרבע.

אחסן בטמפרטורה נמוכה מ- 25 מעלות צלזיוס, מוגן מפני אור. אין לשמור במקרר.

זמן המתנה:

בשר: 14 ימים לאחר הטיפול. חלב: 0 ימים לאחר ההמלטה אם תקופת היובש נמשכה 5 שבועות לפחות. 24 שעות (2חליבות)אם תקופת היובש הייתה קצרה מ-5 שבועות.



Ceftiofur 50mg/ml

בקר:

לטיפול בזיהומים **בדרכי הנשימה** הקשורים
למנהמיה המוליטיקה, פסטרלה מולטיצידה.
Histophilus somni.

לטיפול ב- necrobacillosis interdigital,
דלקת העור בין הטלפיים (Interdigitalis - DID)
Dermatitis (Dermatitis),
(Digitalis - DD)

פנריציום (pododermatitis), הקשורים: ל-
Bacteroides, Fusobacterium necrophorum
melaninogenicus (Porphyromonas
asaccharolytica).

לטיפול **דלקת חריפה לאחר המלטה** (metritis)
הקשורים Escherichia coli,
Archanobacterium pyogenes
, Fusobacterium necrophorum, הרגישים
ל ceftiofur

תרופות מקבילות
אקסנל
קובקטן

מינון: 1 סמ'ק ל 50 ק'ג

ניאו בקטרינה

תרכיב להזרקה בבקר, כבשים ועיזים כנגד דלקת ריאות

התוויות שימוש:

חיסון פעיל ופסיבי של בקר, כבשים ועיזים להפחתת התמותה, וסימנים קליניים הנגרם על ידי *Pasteurella multocida* ו-*Mannheimia haemolytica*.

חומרים פעילים:

The composition per dose (2 ml):

**Pasteurella multocida* (serotype A) strains P-1062 and 11 A inactivated > 1:20 ELISA

**Mannheimia haemolytica* (serotype 1) strains 43270 and S 10R, inactivated > 1:16 ELISA

*Leukotoxoid of *M. haemolytica* (serotype 1) strains 43270 and S 10R, inactivated > 1:40 ELISA

מינון:

2 מ"ל לכול בעלי חיים.


עגלים, כבשים וגדיים: שתי מנות בהפרש 2-4 שבועות מהשבוע הראשון לחיים

מדוע לחסן נגד פסטורלוזיס?

- הוא מגן מפני מוות פתאומי עקב פסטורלוזיס ספטימי.
- מפחית את השכיחות של פסטורלוזיס פנאומוני.
- ממזער את עלות הטיפול לאורך חיי החיה.
- זו החלופה היחידה לאנטיביוטיקה בחוות עם שכיחות גבוהה של זני פסטורלה רב עמידים.
- השפעה חיובית במדדי הייצור הודות תרומה לבריאות החיה

The importance of including Leukotoxoid in vaccines

- Leukotoxoid induces a potent immune response.
- The same Leukotoxin is produced by different strains of *Mannheimia haemolytica*.



Leukotoxoid (inactivated Leukotoxin)

Is considered the main virulence factor in Pneumonic Pasteurellosis. It is responsible for:

- Inducing an excessive and damaging inflammatory response in the animal.
- Destroying neutrophils and macrophages, leading to immune-suppression.
- Necrosis of lung tissue.



סימום מעיים

סיבה באקס



Syva-Bax Suspension for injection



התוויות

חיסון פעיל כנגד מחלות סימום מעיים (Enterotoxaemia) הנגרמות על ידי חיידקים ואו טוקסינים ממשפחת הקלוסטרדיום בבעלי חיים.

חיסון נגד Infectious, tetanus, hepatitis, malignant oedema, pulpy kidney disease, icteric carbuncular fever, necrotizing enterotoxaemia ועוד מחלות הנגרמות על ידי Cl.perfringes מסוגים A, B, C, D - Cl, Cl.novi Septicum, Cl, Cl.chauvoei ו- Cl.sordellii חיסון זה מעניק חיסון פסיבי לצאצאים דרך הקלוסטרם של אימהות מחוסנות, בשלושת החודשים הראשונים לחייהם.

מינון והוראות שימוש

תרכיב זה מיועד להזרקה בלבד. יש לנער היטב לפני השימוש.

בקר: 5 מ"ל תת-עורית.

כבשים ועזים: 2 מ"ל תת-עורית.

חזירים: 2 מ"ל לתוך השריר.

יונקים צעירים: מומלץ להזריק שתי מנות במרווח של ארבעה שבועות ביניהן, החל מהשבוע השני

אימהות: מומלץ לחסן מהשבוע ה-12 לחייהן. חיסון חוזר בכל 6 שבועות.

בוגרים ונקבות שאינן בהריון: שתי מנות במרווח של ארבעה שבועות. יש לחזור על החיסון מידי ששה חודשים

ההריון: בהתאם לתאריך ההמלטה, שני חיסונים:

בשבוע הרביעי ובשבוע השמיני להריון. חיסון שלישי שלושה שבועות לפני ההמלטה.



Agalax Uno

אגלקס אוןו

חיסון פעיל נגד מיקופלסמה אגלקטיה, לכבשים ולעזים

התוויות

חיסון פעיל לכבשים ולעזים נגד מחלות הנגרמות על ידי *Mycoplasma agalactiae*.

מניעת זיהומים וצמצום סימנים קליניים.
תחילת החסינות: כחודש לאחר המנה השנייה שהוגשה.
משך החסינות: ארבעה חודשים לאחר המנה השנייה שהוגשה.
מומלץ לחזור על החיסון מידי ארבעה עד ששה חודשים, בהתאם לרמת הנגיעות ולהמלצות הרופא הווטרינר.
בבעלי חיים בסיכון גבוה מומלץ לתת מנה שנייה לאחר שבועיים עד ארבעה שבועות ממתן המנה הראשונה.
אפשר להשתמש בחיסון בהיריון ובהנקה.
בנקבות מיניקות תיתכן ירידה קלה בייצור החלב.
לאחר כיומיים ממתן החיסון ישוב ייצור החלב לתקנו.
מינון והוראות שימוש
כבשים ועזים: 2 מ"ל לראש.
תרכיב זה ניתן בהזרקה תת-עורית בלבד.
יש לעער היטב לפני השימוש.
זמן המתנה לפני שיווק
0 ימים
אזהרות
אין להשתמש בתרכיב זה בבעלי חיים חולים או הסובלים מלחץ.
אחסון וחיי מדף: נא לאחסן ולהעביר בקירור בטמפרטורה של 2 מעלות עד 8 מעלות.
אין להקפיא את התרכיב.
יש להרחיק מקרני השמש.
יש לשמור באריזה המקורית.
משווק באריזות של 100 מ"ל – 50 מנות.





Syvazul® BTV suspension for injection

(Serotype 1 (BTV-1), serotype 4 (BTV-4), serotype 8 (BTV-8))



חיסון פעיל לכבשים למניעת הוירוס ולהפחתת הסימנים הקליניים הנגרמים על ידי סרוטיפים (Serotype 1 (BTV-1), serotype 4 (BTV-4), serotype 8 (BTV-8)) של נגיף כחול הלשון

ההמלצה לחיסון

כבשים:

- חיסון ראשון: מתן מנה אחת של 2 מ"ל.

- חיסון חוזר: מתן מנה אחת של 2 מ"ל לאחר 12 חודשים.

בקר:

- חיסון ראשון: מתן שתי מנות של 4 מ"ל בהפרש של שלושה שבועות.

- חיסון חוזר: מתן מנה אחת של 4 מ"ל לאחר 12 חודשים.

מחלת כחול הלשון היא מחלה וירלית של כבשים ומעלי גירה אחרים הנגרמת ע"י נגיף ארבו (Orbivirus

ממשפחת ה-Reoviridae) המועבר ע"י חרקים, בחושים.

באופן מסורתי המחלה מיוחסת בעיקר לכבשים. אך בשנים האחרונות היו התפרצויות של המחלה גם בבקר.

מחלת כחול הלשון זוהי מחלה אקוטית המאופיינת בחום גבוה (40.5-42 מעלות צלזיוס), בצקת בולטת באזור הראש, דמומים בחלל הפה, הקורונות ודלקות שרירים.

פ.י.ג.י.אפ ואייקס ***PGF Veyx® forte***




התוויות

תרופה הורמונלית המיועדת לסידור זמני ייחום-ביוץ של פרות ושל חזירות.
מחלות רחם אנדומטריטיס, פיומטרה, טיפול בציסטות לוטאלי בשחלות
תרופה זו מיועדת גם להפסקת היריון עד היום ה-120 להיריון.
בקר (פרות)

זמן המתנה

פרות וחזירות לפני שחיטה: 2 ימים
לחלב: אין זמן המתנה.



PG

בהנחה שהעגלות או הפרות הן מחזוריות. ולא הרות, הפרוטוקול הפשוט והמקובל הוא 2 זריקות PG

PG ראשון

ביום אקראי בהתאם למועד ההזרעה המתוכנן.

PG שני

14-11 ימים אחרי זריקה ראשונה. (עגלות 11 יום, פרות 14 יום)
ההזרעה
הייחום נצפה אחרי 2-3 ימים. (ניתן להזריע כבר אחרי הזריקה הראשונה)

Oxykel 20 L.A.

injectable solution

אוקסיקל 20 תמיסה להזרקה, פעילות ממושכת וטרינרי



אופן המתן והמינון:

בהתאם להוראות הרופא הוטרינר.
המינון המומלץ הוא 20 מ"ג/ק"ג משקל גוף (1 מ"ל ל 10 ק"ג משקל גוף) בזריקה לשריר.
מתן מקסימלי לבקר 25 מ"ל לנקודת הזרקה.
בהתאם לחריפות המחלה, ייתכן ויהיה צורך לחזור על הטיפול אחרי 72 שעות (3 ימים).
אין להזריק שוב באותה נקודת הזרקה.

התוויה

זיהומים הנגרמים על ידי מיקרואורגניזמים הרגישים לאוקסיטטרציקלין, כגון זיהומים בדרכי הנשימה, דרכי העיכול, דרכי השתן, רקמות רכות, עור ופצעים, זיהומים משניים
בקר: דלקת ברונכיטיס, shipping fever, קוליבצילוזיס. נקרובצילוזיס אנפלסמוזיס, לפטוספירוזיס, פאנאריטיום, אנתרקס.
כבשים, עזים: זיהומים בדרכי הנשימה, ריקבון הטלף, מחלת טבור הפלה אנזואטית (כלמידיוזיס) clamidiosis.
חזירים: דלקת ריאות אנזואטית, נזלת, קוליבצילוזיס בחזירונים, לפטוספירוזיס, אפידרמיטיס

דקסקל וטרינרי



DEXAKEL VETERINARY

מרכיב פעיל DEXAMETHASONE AS SODIUM PHOSPHATE 2 MG/ML

Target species



תכונות פרמקולוגיות:

Dexamethasone הוא גלוקוקורטיקוסטרואיד סינתטי חזק, בעל השפעה אנטי דלקתית החזק פי 30 מקורטיזון וחזק פי 7-10 מפרדניזון. בנוסף, לדקסמתזון תכונות אנטי-אלרגיות, גלוקונוגנטיות ואנטי סטרס יוצאות דופן.

לשימוש:

תהליכים מטבוליים כמו קטוזיס בבקר וכבשים. תהליכים דלקתיים לא זיהומיים, במיוחד דלקת שלד בשרירים ושלד (דלקת פרקים, בורסיטיס, דלקת מפרקים ניוונית, דלקת הגידים, נקעים, דלקת בשרירים, עצמות וגידים). במחלות זיהומיות חריפות (דלקת עטין חריפה, דלקת מפרקים, דלקת ריאות) בשילוב עם טיפול אנטיביוטי מתאים. מצב אלרגי (אסטמה, אקזמה, גרדת, למיניטיס אצל סוסים ובקר, עקיצות נחש). לחץ וסטרו.

מינונים:

חתולים, כלבים: (0.1 - 0.2 מ"ג לק"ג) 0.25 - 0.5 מ"ל / 5 ק"ג.
בקר, סוסים: (2.5 - 5 מ"ג / 100 ק"ג) 5 - 10 מ"ל / 400 ק"ג.
כבשים, עזים, עגלים: (2 - 4 מ"ג / 50 ק"ג) 1 - 2 מ"ל / 50 ק"ג.
לזירוז המלטה בפרות: (שבוע לפני תאריך ההמלטה הצפוי): (5 מ"ג / 100 ק"ג) 2.5 מ"ל / 100 ק"ג.
זירוז המלטה בכבשים עזים: (2.5 מ"ג / 10 ק"ג) 6 מ"ל / 50 ק"ג.

כמות לאריזה: 50 מ"ל



סייקווינול 10%

Syvaquinol

אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים בתמיסה למי שתייה

הרכב: Enrofloxacin 100 mg/ml

התוויות:

לטיפול ומניעה של זיהומים הנגרמים על ידי משפחת חיידקים גרם חיוביים/שליליים הרגישים לאנרופלוקססין

Mycoplasma gallisepticum

Mycoplasma synoviae

Avibacterium paragallinarum

Pasteurella multocida

מינון

1 מ"ל תכשיר לכל 10 ק"ג ביממה למשך 3 – 5 ימים (שווה ל-500 מ"ל תכשיר לקוב מים). יש להכין תמיסה טרייה מידי יום, ולפנות את השאריות מהיום הקודם. יש להשתמש בכפפות.

אריזה

משווק באריזות של 5,1 ליטר.

;


Clortetraciclina 20% UCL® Veterinary

כלור-טטרהציקלין 20% יו.סי.אל וטרינירי

מרכיב פעיל: 20% Chlortetracycline (as HCl)

אבקה להמסה במי השתיה

Chlortetracycline HCl מאופיין בספקטרום הפעילות האנטי-מיקרוביאלי הרחב שלו במתן במים נספג במהירות במערכת העיכול ובכך מאפשר להגיע לרמות גבוהות של נוזלים בדם ורקמות. פעולה בקטריוסטטית על מספר גדול של חיידקים גראם חיוביים וגראם שליליים, כגון סלמונלה ופסטורלה. Chlortetracycline HCl לטיפול בזיהומי מעיים ומחלות נשימה.



פרטווט

Partovet

הורמונים סינתטיים לשימוש וטרינרי בהזרקה

הרכב

כל 1 מ"ל מכיל 10 יב"ל אוקסיטוצין סינתטי,

Chlorbutanol, benzyl alcohol, sodium, chloride, acetic acid

התוויות

להשפעה על שרירי הרחם בשלבים האחרונים של ההיריון, במהלך ההמלטה ומספר ימים לאחר מכן. התכשיר משמש להחשת תהליך ההמלטה, לסילוק השליה ו/או להגברת מתן חלב בפרות, סוסות, כבשות, כלבות, חתולות וחזירות.

מינון

מתן בהזרקה תוך-שרירית, תת-עורית או תוך-ורידית (חצי מינון). אפשר לדלל במים המיועדים להזרקה. מינון מומלץ:

סוסות ופרות: 4 – 6 מ"ל

כבשות ועזים: 1 – 2 מ"ל

חזירות: 2 – 4 מ"ל

כלבות וחתולות: 0.25 – 1 מ"ל

במידת הצורך אפשר לחזור על הטיפול מידי 40 דקות.

הערה: בזמן ההמלטה יש להגיע להרפיה מוחלטת של צוואר הרחם, באופן טבעי או על ידי שימוש באסטרוגן לפני מתן האוקסיטוצין.





Procactive 300 mg/ml injectable suspension



אריזה	זמן המתנה	מתן	(רכיבים פעילים)
בקבוקון 100 מ"ל	חזירים: בשר: 6 ימים פרות: בשר: 6 ימים, (חלב: 96 שעות) 4 ימים	תוך שריר	בנזילפניצילין פרוקאין

פוסולוגיה

המינון המומלץ הוא 10 מ"ג של בנזילפניצילין פרוקאין לק"ג משקל גוף (שווה ערך ל- 5.66 מ"ג בנזילפניצילין לק"ג) המקביל ל- 1 מ"ל לכל 30 ק"ג משקל גוף בכל יום למשך 3-5 ימים

אין להזריק יותר מ- 2.5 מ"ל לאתר הזרקה לחזירים

אין להזריק לפרות יותר מ- 12 מ"ל לאתר הזרקה

טיסול 1 ליטר / 5 ליטר



תמיסה וטרינרית **T.S.** (טיסול)

T.Sol

תמיסה טיפולית מרוכזת המכילה סולפאמטוקסזול בעל טווח פעולה רחב בשילוב טרימתופרים

הרכב

כל 1000 מיליליטר תכשיר מכילים:

Sulphamethoxazole 80 mg

Trimethoprim 20 mg

התוויות

תכשיר זה מיועד לטיפול בזיהומים חידקיים של דרכי הנשימה ו/או מערכת העיכול הרגישים למשפחת הסולפונאמידים / טרימתופרים.

מיועד לטיפול בבעלי כנף או בחזירים.

אם לא חל שיפור בסימנים הקליניים, יש לבדוק אבחנה ולשנות את הטיפול בהתאם.

מינון

מנה יומית של 24 מ"ג סולפאמטוקסזול ו-6 מ"ג טרימתופרים לכל קילוגרם ממשקל גוף למשך 4 – 7 ימים.

1 – 2 ליטר תכשיר לכל 1000 ליטר מי שתייה רצופה במשך 4 – 7 ימים.



טילוקל 20

Tylokkel 20

תמיסת טילוזין להזרקה תוך-ורידית בבקר

הרכב

כל 1 מ"ל מכיל 200 מ"ג טילוזין Tylosin as Tartrate

התוויות

תרופה אנטיביוטית מקבוצת המקרולידיים.

אנטיביוטיקה זאת פעילה נגד חיידקים גראם-חיוביים וסוגי ספירוכטות, ויבריו שונים.

אנטיביוטיקה זאת פעילה במיוחד נגד חיידקי מיקופלזמה או PPLO'S בבקר.

מינון

מינון מומלץ בבקר: 10 – 2.5 מ"ג לכל ק"ג משקל גוף, כלומר:

בקר: 0.5 - 1 מ"ל 10 ק"ג משקל גוף מדי יום, במהלך 3 - 5 ימים.

עגלים, כבשים, עזים: 0.3 - 0.4 מ"ל גוף של 10 ק"ג משקל גוף מדי יום, במהלך 3 - 5 ימים.

תרופה זו מיועדת למתן באינפוזיה אטית מאוד.

Target species



שימוש:

מניעה וטיפול בדלקות בדרכי הנשימה בכל בעלי החיים כגון ברונכופנומוניה, נזלת, דלקת ריאות זיהומי,

מיקופלזמה CRD, סינוסיטיס זיהומיות, דלקת פרקים.

דלקות פצעים ועור - דלקת מפרקים, דלקת עטין, foul-in-the-foot בבקר - erysipelas, דיזנטריה בחזירים -

לפטוספירוזיס, דלקת אוזניים אצל כלבים - זיהומים משניים.

דלי מולסה עם יסודות קורט ומינרלים חיוניים לבקר, סוסים, כבשים, עזים וחיות משק.

ה- **JOSERA Universalleimer** הוא מזון מינרלים באיכות גבוהה המתאים לבקר, כבשים, עזים, צבאים וסוסים. דלי ליקוק טעימה מאוד ועמידה בפני מזג אוויר. הוא משמש כדי לכסות את דרישת בעלי החיים למינרלים ויסודות קורט.
הוא גם **לא מכיל נחושת**, מה שהופך אותו מתאים גם לכבשים, עזים ואיילים.

תכונות המוצר:

Ca/P = 3,8:1

מכיל מיקרואלמנטים, ברזל, אבץ, מנגן, יוד, כרום, סלניום, מוליבדן, ונדיום וקובלט.

ללא תוספת נחושת

מכיל מולסה 15 % ממקור סלק סוכר

סוכרים 20 %

סובין עשב חיטה 5.0%

יתרונות המוצר:

המוצר משלב אבן מלח וגם מולסה מסלק סוכר איכותית

עמידות גבוהה בפני מזג אוויר

טעימות גבוהה

תוצרת Josera GmbH גרמניה



היישום העיקרי

בתקופת יובש לפני המלטה	הכנה להמלטה	תחלובה	כבשים, עזים



אקומקטין 1%

Ecomectin veterinary

נוגד טפילים פנימיים וחיצוניים להזרקה בבקר, בכבשים ובחזירים

הרכב

כל 1 מ"ל מכיל Ivermectine 10 mg

התוויות

תרופה מקבוצת האיברמקטינים (Ivermectine) מיועדת לטיפול ושליטה בטפילים שונים: בקר וכבשים: תולעים עגולות של קיבה ומעיים, תולעי ריאות, דלקות עור או דרמטיטיס מטפילים כמו sheep scab, זוחלי אף (nasal bots) ועוד.

חזירים: תולעים עגולות של קיבה ומעיים, תולעי ריאות, דלקות עור ומיאזיס, וכן טפילים חיצוניים, כגון קרדיות וכינים. עוזר בשליטה על הקרציות מינון

להזרקה תת-עורית בלבד.

יש להשתמש במזרק ומחט סטריליים בלבד.

לפני ההזרקה יש לנקות ולחטא היטב את מקום ההזרקה כדי למנוע זיהומים.

בקר: 1 מ"ל תכשיר לכל 50 ק"ג משקל גוף.

כבשים: 0.5 מ"ל לכל 25 ק"ג משקל גוף. בכבשים צעירים מתחת ל-20 ק"ג יש לתת 0.1 מ"ל לכל 5 ק"ג משקל גוף.

חזירים: 1.5 מ"ל לכל 50 ק"ג משקל גוף. בחזירונים צעירים מתחת ל-16 ק"ג יש לתת 1.5 מ"ל לכל 3 ק"ג משקל גוף.

תדירות ההזרקה והזרקות חוזרות: יש להתייעץ עם וטרינר, כל מצב ומחלה לגופם.

אזהרות ואחסון וחיי מדף – יש לעיין בעלון לצרכן המצורף למוצר

זמן המתנה לפני שחיטה

פרות: 49 ימים

כבשים: 42 ימים

חזירים: 28 ימים

נקבות חולבות ולא חולבות:

אסור להשתמש בחלב של נקבות בזמן הטיפול.

אין להשתמש בתכשיר זה בנקבות חולבות.

אין לתת תכשיר זה בנקבות שאינן חולבות לפחות 60 יום לאחר ההמלטה.

אריזה

משווק באריזות של 50,200,500 מ"ל .